

RIXX - Schlankheitstropfen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie nach 12 Wochen keine Gewichtsreduktion erreicht haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist RIXX und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von RIXX beachten?
3. Wie ist RIXX einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist RIXX aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist RIXX und wofür wird es angewendet?

RIXX ist eine homöopathische Arzneispezialität.

Anwendungsgebiet:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel ist folgendes Anwendungsgebiet zugelassen:

- Unterstützung der Gewichtsabnahme

RIXX ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel. Diese Arzneimittel setzen sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammen, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie nach 12 Wochen keine Gewichtsreduktion erreicht haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

RIXX wird angewendet bei Erwachsenen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von RIXX beachten? RIXX darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen *Apocynum cannabinum*, *Fucus vesiculosus*, *Graphites*, *Silybum marianum*, *Thuja occidentalis*, *Zincum metallicum* oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie RIXX einnehmen.

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden; eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos. Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder angewendet werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollten von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome (neue Beschwerden) auftreten können.

Kinder und Jugendliche

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Einnahme von RIXX zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich

andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Einnahme von RIXX zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

RIXX soll aufgrund der Indikation in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt. Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind bisher nicht bekannt geworden. Der Alkoholgehalt von ca. 54,5 Vol.-% ist zu beachten.

RIXX enthält Spuren von Laktose und Alkohol

Dieses Arzneimittel enthält Spuren von Laktose (weniger als 10 mg pro maximale Tagesdosis). Diese Menge stellt kein Risiko für Patienten mit Laktoseintoleranz dar. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer anderen Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält pro Einzeldosis (15 Tropfen) ca. 300 mg Alkohol, entsprechend ca. 7,6 ml Bier bzw. ca. 3,2 ml Wein; pro Tagesmaximaldosis (45 Tropfen) ca. 900 mg Alkohol.

Es besteht ein gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. Wie ist RIXX einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene:

2-3-mal täglich 15 Tropfen

Bei Beginn von Schlankheitskuren werden stündlich 5 Tropfen eingenommen.

Zum Einnehmen.

Die abgezählten Tropfen sollen in einem Glas mit etwas Wasser verdünnt und vor den Mahlzeiten eingenommen werden.

RIXX soll über einen längeren Zeitraum in Verbindung mit einer ausgewogenen und kalorienreduzierten Ernährung eingenommen werden. Auch Bewegung in frischer Luft unterstützt das Bemühen um Gewichtsreduktion. Sie sollten versuchen, schrittweise und kontinuierlich abzunehmen: pro Monat sind ca. 2 kg ideal.

Wenn Sie nach 12 Wochen keine Gewichtsreduktion erreicht haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von RIXX eingenommen haben, als Sie sollten

Der Alkoholgehalt von ca. 54,5 Vol.-% ist zu berücksichtigen.

Bei versehentlicher Einnahme des gesamten Flascheninhalts von 100 ml werden ca. 42 g Alkohol aufgenommen.

Dies kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen.

Wenn Sie die Einnahme von RIXX vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen sind keine bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist RIXX aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren.
Nach Anbruch nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verw. bis.“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: 3 Monate

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden.

Sie tragen zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**Was RIXX enthält**

100 ml enthalten:

- Die Wirkstoffe sind: Apocynum cannabinum D2 18 ml, Fucus vesiculosus D6 18 ml, Graphites D10 10 ml, Silybum marianum D1 18 ml, Thuja occidentalis D12 18 ml, Zincum metallicum D12 18 ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind: gereinigtes Wasser, Ethanol (Gesamtalkoholgehalt ca. 54,5 Vol.-%), Spuren von Lactose-Monohydrat

1ml = 0,9 g = 23 Tropfen

Wie RIXX aussehen und Inhalt der Packung

Gelbliche, klare Lösung (Tropfen zum Einnehmen) in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz und Verschluss aus Kunststoff.

Packungsgröße: 100 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber
HWS-OTC Service GmbH
Steindorf 65
5570 Mauterndorf

Hersteller

Marien-Apotheke
Inhaber Dr. Clemens Reuther e.K.
Marktplatz 10
83209 Prien am Chiemsee
Deutschland

Z.Nr.: 3-00075

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Jänner 2020.